

Temoinage des pays voisins: autour du projet “*Flore des bryophytes des Pays Bas*”

S. Robbert Gradstein



Muséum national d' Histoire naturelle, Paris
Académie des Sciences, Göttingen



Colloque de Bryologie Bordeaux 1977







Passie voor mossen



KNNV Uitgeverij



Een historische schets van de Nederlandse
bryologie en lichenologie ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van de Bryologische en
Lichenologische Werkgroep van de KNNV

Ger Harmsen

1946: *Société Néerlandaise pour la Bryologie*

- Section de la Société Nationale d'Histoire Naturelle
- Ca. 400 membres
- Excursions, inventaires, cours, colloques, etc.
- Publications

1977: *Projet "Flore des Bryophytes des Pays Bas"*

Projet: "*Flore des Bryophytes des Pays Bas* "

1. Préparation des descriptions, illustrations et cartes des espèces, basée sur une révision des collections d'herbiers (institutionnel et privé : 55 herbiers) > 100.000 échantillons
2. Préparation d'une banque de données pour la cartographie des espèces

Projet: "*Flore des Bryophytes des Pays Bas* "

Phase 1 (1977-1989)

Flore des **mousses**, **exécuted** à l'Herbier National à Leiden, avec un financement de la Fondation Nationale pour la Recherche.

2 bryologues (professionels)


Phase 2 (1993-2002)

Flores des **hépatiques**, **anthocérotes** et **sphaignes**, par des membres De la Société Néerlandaise de Bryologie (sans financement gouvernemental).

volume sur les hépatiques et antocérotes: 11 collaborateurs (*révision du matériel*), 2 coordinateurs (*édition du livre, banc des données, cartes, rév. du matériel, etc.*), 3 artistes

Résultat : Flore en 3 volumes

1989




382 spp.

1996




126 spp.

2002



30 spp.

Illustrations des mousses



Banque de données (situation 2011: version Internet)

955.000 d' échantillons et observations


BLWG Verspreidingsatlas Mossen online

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Q zoek op (deel van) soortnaam

[canescens](#)
[Racomitrium canescens var. ericoides](#)
[Racomitrium canescens var. intermedium](#)
[Racomitrium elongatum](#)
[Racomitrium ericoides](#)
[Racomitrium fasciculare](#)
[Racomitrium heterostichum](#)
[Racomitrium heterostichum var. alopecurum](#)
[Racomitrium heterostichum var. heterostichum](#)
[Racomitrium heterostichum var. obtusum](#)
[Racomitrium lanuginosum](#)
[Racomitrium obtusum](#)
[Radula complanata](#)
[Reboulia hemisphaerica](#)
[Rhizomnium pseudopunctatum](#)
[Rhizomnium punctatum](#)
[Rhodobryum roseum](#)
[Rhynchosegiella compacta](#)
[Rhynchosegiella curviseta](#)
[Rhynchosegiella jacquinii](#)
[Rhynchosegiella pumila](#)
[Rhynchosegiella tenella](#)
[Rhynchosegiella tenella](#)

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Rozetmos



■ < 1980 (49 atlasblokken)
● => 1980 (27 atlasblokken)
● => 1980 (gerevideerd herbariummateriaal)
(c) 2011 BLWG

[algemeen](#) | [ecologie & verspreiding](#) | [literatuur \(8\)](#) | [flora's \(1\)](#) | [taxonomie](#) | [feedback \(0\)](#)

Familie: [Braceae](#)
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort

Europees areaal: boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond: Disjunct circumpolair

Levensstrategie: blijver
Biotoop: bosbodem
Substraat: grof strooisel
Controle: veldwaarneming


ecologie en verspreiding
Rozetmos is tegenwoordig beperkt tot min of meer kalkrijke duingebieden. De verspreidingsdichtheid wisselt hier van vrij algemeen (zoals in het Noordhollands Duinreservaat) tot schaars. Gewoonlijk sta... [meer](#)

[afbeeldingen](#) [\[toevoegen\]](#)




<http://www.verspreidingsatlas.nl/mossen>

Bryum argenteum Hedw.
Zilvermos




Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche,
Lindenb. & Nees
Bros roestmos





Espèces en régression



Dicranum spurium Hedw.
Gekroesd gaffeltandmos



Frullania tamarisci (L.) Dumort.
Flesjesroestmos




Espèces en régression (voire en extinction)





Espèces en progression

Dicranum tauricum Sapjegin
Bros gaffeltandmos




Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
Krulbladmos




Espèces en progression

Fissidens crassipes Schimp.
Gewoon riviervedermos



Fissidens arnoldii R. Ruthe
Klein riviervedermos








Figure 4. Native regional distribution shown in black. Alien regional distribution shown in red.
From Klinck 2009.

Orthodontium lineare

1950




2011



Campylopus introflexus

1950



2011

